

**ATLAS**  
**SELTENER OPHTHALMOSKOPISCHER BEFUNDE**

ZUGLEICH

ERGÄNZUNGSTAFELN

ZU DEM

**ATLAS DER OPHTHALMOSKOPIE**

VON

**HOFRAT DR. J. OELLER,**

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ERLANGEN.

---

VIERTE LIEFERUNG. 5 TAFELN MIT TEXT.

---

**ATLAS**  
**OF RARE OPHTHALMOSCOPIC CONDITIONS**

AND

SUPPLEMENTARY PLATES

TO THE

**ATLAS OF OPHTHALMOSCOPY**

BY

**HOFRAT DR. J. OELLER,**

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF ERLANGEN.

THE TEXT TRANSLATED INTO ENGLISH BY THOS. SNOWBALL, M. A., M. B., BURNLEY, ENGL.

---

PART IV. 5 PLATES WITH TEXT.

---

WIESBADEN,  
VERLAG VON J. F. BERGMANN.

1905.







ATLAS  
SELTENER OPHTHALMOSKOPISCHER BEFUNDE.

ZUGLEICH  
ERGÄNZUNGSTAFELN

ZU DEM  
ATLAS DER OPHTHALMOSKOPIE

VON  
HOFRAT DR. J. OELLER,  
PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ERLANGEN.

VIERTE LIEFERUNG. 5 TAFELN MIT TEXT.

---

ATLAS  
OF RARE OPHTHALMOSCOPIC CONDITIONS

AND  
SUPPLEMENTARY PLATES  
TO THE  
ATLAS OF OPHTHALMOSCOPY

BY  
HOFRAT DR. J. OELLER,  
PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF ERLANGEN.

THE TEXT TRANSLATED INTO ENGLISH BY THOS. SNOWBALL, M. A., M. B., BURNLEY, ENGL.

PART IV. 5 PLATES WITH TEXT.

---

WIESBADEN.  
VERLAG VON J. F. BERGMANN.

1905.



281656691

and the other side of the road

Optical microscopy was used for the first time

ATLAS  
SELTENER OPHTHALMOSKOPISCHER BEFUNDE.

ZUGLEICH

ERGÄNZUNGSTAFELN

ZU DEM

ATLAS DER OPHTHALMOSKOPIE

VON

HOFRAT DR. J. OELLER,

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ERLANGEN.

---

VIERTE LIEFERUNG.

---

WIESBADEN.  
VERLAG VON J. F. BERGMANN.

1905.



---

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

---

ATLAS  
OF  
RARE OPHTHALMOSCOPIC CONDITIONS  
AND  
SUPPLEMENTARY PLATES  
TO THE  
ATLAS OF OPHTHALMOSCOPY

BY  
HOFRAT DR. J. OELLER,  
PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF ERLANGEN.

THE TEXT TRANSLATED INTO ENGLISH BY THOS. SNOWBALL, M. A., M. B., BURNLEY, ENGL.

---

PART IV.

---

WIESBADEN.  
J. F. BERGMANN, PUBLISHER.

1905.



---

ALL RIGHTS RESERVED.

---



C.

Erkrankungen der Netzhaut.

Diseases of the Retina.

---

Tab. XI.

OBLITERATIO VASORUM RETINAE SUPERIORUM;  
RETINITIS PROLIFERANS.

---



## C. Tab. XI.

### Obliteratio vasorum retinae superiorum; Retinitis proliferans oculi dextri.

Die 76jährige Leichenfrau J. E. war niemals ernstlich krank. Anfang November 1902 traten plötzlich „Spinnen“ vor dem rechten Auge auf. Bei ihrer Vorstellung am 9. 11. 02 war das Sehvermögen bis auf Fingerzählen in 1 Meter herabgesetzt. Als Ursache hierfür waren zahlreiche, dicht stehende, dunkelrote Blutungen verschiedener Grösse und Form zu konstatieren, die sich hauptsächlich an den Verbreitungsbezirk der oberen äusseren Temporalgefässe hielten, aber auch über die Sehnervengrenzen in die Papille hereintraten. Die Gefässe waren durch die Blutungen so verdeckt, dass über ihr Verhalten nichts Bestimmtes zu eruieren war.

Schon damals war eine ausgesprochene Arteriosklerose und Spuren von Eiweiss im Urin zu konstatieren.

Als Patientin anfangs Januar d. J. nach langer Pause wieder sich vorstellte, bot sie folgenden Befund:

Arteriosklerose; leichte Paralysis agitans der rechten Hand; Lungenemphysem; Hypertrophie des linken Ventrikels; Stauungsleber; Spuren von Eiweiss im Urin, keine Cylinder, aber massenhaft Bakterien und Leukocyten, einzelne Blasenepithelien.

Linkes Auge:

S =  $\frac{6}{15}$ ; + 2 D. S =  $\frac{6}{8}$ ; + 5.5 D. N. 1

Hintergrund ohne Anomalie.

Rechtes Auge;

Exzentrisch nach oben Finger in  $\frac{1}{2}$  Meter erkannt.

In der Linse unten einige kurze Radien. Bewegliche Glaskörpertrübungen, die die Untersuchung sehr erschweren.

Der Sehnerv ist nur zum Teil zu sehen. Seine obere Partie ist fast bis zur Gefässpforte herab durch eine sofort in die Augen springende, grünlichweisse, leicht prominente Wucherung offenbar bindegewebiger Natur verdeckt. Sie hat annähernd die Form eines Papierdrachen und ist schräg von oben aussen über den oberen Papillenrand hinweg nach unten innen gerichtet. Eine ebenfalls schräg in der Längsrichtung laufende Furche, aus der röthliches Licht dringt, teilt die Bildung in annähernd zwei gleiche Hälften. Die obere, die mit scharfem Rande gegen das Rot des Hintergrundes sich absetzt, zeigt flache, straffe Falten, in welchen mehrere Gefässe verlaufen. Die untere Hälfte, die gegen die rote Furche einen stark hervorspringenden Wulst bildet, hängt wie eine zarte, durchscheinende Schürze über den oberen Papillenrand herab, der mit seinem oberen äusseren Kontur schwach durchschimmert. Eine Garbe zarter, dicht stehender Gefässe legt sich über den Wulst, die am Schürzenrande mit feinen Schlingen endigen. Ob sie arterieller oder venöser Natur sind, lässt sich nicht entscheiden. Sie stammen grösstenteils von einem grösseren Gefässe, das aus der Bucht entspringt, die die zentrale Furche nach unten innen bildet. Gerade nach dieser Richtung springt das untere Ende der Wucherung als breiter, rundlicher, etwas überhängender Wulst vor, der auf den Papillenrand und seine nächste Umgebung einen breiten Schatten wirft. Nach oben innen setzt sich eine mehr quadratische Masse an, deren Ecken ziemlich weit ausgezogen in die Nachbarschaft ausstrahlen. Mit Ausnahme einer gerade von oben herabkommenden Vene, die über den oberen Rand der Bindegewebsplatte in eine Falte derselben eintaucht, sind in den oberen Partien des Hintergrundes keine blutführenden Gefässe zu sehen. Nach aussen oben und oben aber von der Spitze der Wucherung tauchen mehrere deutlich sichtbare, weissgelbliche Streifen auf, die ihrer Grösse, ihrer Lage, ihrem Verlaufe und ihrer Teilung nach nur vollkommen obliterierte Netzhautgefässe sein können. Um die ganze parapapilläre Wucherung zieht sich ein breiter, zarter grau-


roter Hof, namentlich aber makularwärts und um den Sehnerven, der in einer dünnen Nebelkappe zu stecken scheint. Sein temporaler Rand ist in breiter Zone blendend weiss, während die mittleren Partien etwas röter als normal erscheinen und keine sichtbare Gefässpforte aufweisen. Aus der Papille treten nur wenige in ihrem Ursprung schwer wahrnehmbare grössere Gefässe nach abwärts auf. Am temporalen Sehnervenrand schimmert ein etwas hellerer, gelbrötlicher, breiter, staphylomähnlicher Hof durch die graue Trübung durch. An Stelle der Macula lutea liegt ein wurmartig gekrümmter, gelblichweisser Herd, von einem braunroten Hofe umgeben. Nirgends ist mehr eine Blutung zu konstatieren.

Das vorliegende Bild müssen wir wohl unter die Retinitis proliferans einreihen, wenn es auch in mancher Beziehung von dem gewöhnlichen Verhalten abweicht. Die Retinitis proliferans stellt ja ohnedies in der Ausdehnung, die von mancher Seite dem Begriffe gegeben wird, weder in klinischer noch pathologisch-anatomischer Beziehung eine Einheit dar. Werden ja doch auch Streifen und Membranen im Glaskörper mit der Bezeichnung Retinitis proliferans belegt, die ohne Verbindung mit der Netzhaut stehen, während doch nur bindegewebige Stränge und Platten dazu gezählt werden sollten, die zweifellos von der Netzhaut oder dem Sehnerven ausgehen und wenn auch mehr minder gegen den Glaskörper prominent doch vorzüglich in die Netzhaut ausstrahlen.

Von diesem Gesichtspunkte aus dürfen wir auch den vorliegenden Fall unter die Retinitis proliferans rechnen. Denn die grünlichweisse, oberhalb des oberen Papillenrandes von der Netzhaut sich abhebende Masse mit ihrer zerklüfteten Oberfläche und den zahlreichen neugebildeten Gefässen kann nur eine bindegewebige Wucherung sein, deren Genese allerdings nur nach Analogie mit anatomisch untersuchten Fällen wahrscheinlich gemacht werden kann. Wenn ich auch trotz der grossen Zahl der beobachteten Fälle noch keinen ohne Netzhautblutungen in der frühesten Phase der Entstehung gesehen habe, so glaube ich doch nicht, dass organisierte Extravasate das Wesen der Retinitis proliferans ausmachen. Die Bindegewebswucherung kann allem Anscheine nach nur aus präformierten bindegewebigen Elementen in der Netzhaut stammen. Mit Römer nehme aber auch ich an, dass die Bindegewebsneubildung verschiedener Provenienz sein kann. Vor allem werden es wohl die Stützfasern und die Bindegewebscheiden der Gefässe sein, die bei dem Wucherungsprozesse in erster Linie in Betracht kommen. Purtscher hat sicher mit Recht auf das häufige Vorhandensein einer Gefässerkrankung bei den typischen Fällen von Retinitis proliferans hingewiesen.\*) Der vorliegende Fall dürfte eine weitere Bestätigung für diese Annahme sein. Es sind die oberen Netzhautgefässe mit Ausnahme einer Vene obliteriert. Diesem Stadium gingen vor 2½ Jahren Netzhautblutungen voraus, die bei ihrer Lokalisation und der nachgewiesenen Arteriosklerose die Erkrankung eines bestimmten Gefässbezirktes ausser Zweifel setzten. Obwohl die erste ophthalmoskopische Untersuchung die Vermutung auf Thrombose der oberen temporalen Venenäste zuliess, so muss es doch, da die verschiedenen Phasen der Entwicklung nicht verfolgt werden konnten, dahingestellt bleiben, ob es sich um eine venöse Astthrombose oder um eine Thrombosierung der oberen temporalen Arterien und sekundäre Venenthrombose gehandelt hat. In jedem Falle ist bei der vorhandenen Arteriosklerose und

\*) Vergl.: Öller Atlas seltener ophthalmoskopischer Befunde. II. Lieferung. C. Tab. V.





*J. Oeller pinx.*

Obliteratio vasorum retinae superiorum.

Retinitis proliferans.



OLDOUT BL



der wahrscheinlich bestehenden Phlebosklerose die spätere gänzliche Obliteration der oberen Netzhautgefäße verständlich. Mit dem Nachweis einer Gefässerkrankung allein ist aber noch keine Erklärung für den Wucherungsprozess des Bindegewebes in den Gefäßsscheiden gegeben. Durch die bis jetzt anatomisch untersuchten Fälle von Retinitis proliferans dürfen wir wohl annehmen, dass das im Sehnervenkopfe oder den angrenzenden Netzhautpartien neugebildete Bindegewebe seine exzessive Entwicklung verschiedenen präexistenten Elementen verdankt. Wenn auch für gewöhnlich nicht in bedeutendem Grade, so werden doch durch vorausgegangene, rezidivierende Blutungen Netzhautelemente zertrümmert, für deren Ersatz dann Gliawucherungen ausgehend vom Stützgerüste eintreten. Mögen dieselben für gewöhnlich auch nicht bedeutend sein, so müssen wir doch annehmen, dass sie unter besonders günstigen Bedingungen auch exzessiv sich gestalten können.

Wie nun das Bindegewebe der Gefäßsscheiden in solchen Fällen mit zur Proliferation angeregt wird, lässt sich nicht ohne weiteres entscheiden. Wie andere Untersucher habe auch ich schon in mehreren Fällen in der wuchernden Masse auffallend zahlreiche, neugebildete Gefäße gesehen, die in älteren Fällen zum Teil sich zurückbilden können. Die Bindegewebswucherung des vorliegenden Falles zeichnet sich durch einen besonderen Reichtum an Gefäßen aus. Wenn es auch selbstverständlich ist, dass junges, wucherndes Gewebe zu seinem Aufbau zahlreiche Gefäße braucht, so zwingt sich doch auch der Gedanke auf, ob nicht gerade das Aussprossens so zahlreicher neuer Gefäße aus der Wandung präexistierender Kapillaren eines Gefäßbezirkes, der durch den sklerotischen Prozess hochgradig erkrankt ist, den Anstoss zur Wucherung des Bindegewebes der Gefäßsscheiden gibt. Im vorliegenden Falle sind zahlreiche wichtige Gefäßbahnen durch ihre Obliteration vollständig ausgeschaltet worden. Es ist als eine

Selbsthilfe der sucht. Aus ne gebildet und und Venen e Muskelfasern laren heranwa nachbarten N Blutungen un Hyperplasie aus den Gefä einer mächtig bindegewebige am oberen Pa Faktor in der gewebswucher Form angeno straffen, leiste unteren Part Papillenrand schlingen dar Jäger und wieder von H körper. Hirsch Entzündung ziemlich klare ausserordentli umhüllt sind u hautentzündun

\*) Hirsch praktische Auge

J. E., female, aet. 76 years, who had always enjoyed good health, came to the clinic on the 9<sup>th</sup> November 1902 with the history that in the beginning of the same month she had suddenly observed a "spider's web" in front of her right eye. The vision on that eye was then reduced to counting fingers at 1 metre. This was found to be due to the presence of numerous dark-red haemorrhages of various shapes and sizes closely studded together, which were chiefly confined to the area of distribution of the upper and outer temporal vessels, although they also extended over the margin of the optic disc and encroached on it. The vessels were so much obscured by these haemorrhages that it was impossible to make out anything definite as to their condition.

At that time there was well-marked arteriosclerosis, and the urine showed a trace of albumin.

The patient was seen again after a long interval in the beginning of last January, when her condition was as follows:

Arteriosclerosis; slight paralysis agitans in the right hand; pulmonary emphysema; hypertrophy of the left ventricle of the heart;

by a greenish tissue character it is roughly from above a edge of the furrow which The upper ha the adjacent f vessels run. in contrast w over the upp it on its oute nence: they of the apron. The majority from the po At this point of a broad,



fine, greyish-red halo which is most marked in the macular region and round the optic disc, the latter appearing as if enveloped in a thin mist. The temporal part of the disc is seen as a broad shining-white crescent, while the centre appears somewhat redder than normal and shows no sign of an optic cup. Only one or two medium-sized vessels emerge from the disc and run downwards: it is difficult to make out their point of origin. A somewhat lighter, yellowish-red band like a staphyloma is seen next the temporal margin of the disc, shining through the greyish haze. The position of the macula lutea is occupied by a curved, yellowish-white patch surrounded by a brown-red ring. No trace of haemorrhages can be seen anywhere.

This case must, I think, be classed as one of retinitis proliferans, although it differs from the usual form in many respects. Still, owing to the elasticity with which the term 'retinitis proliferans' is used by many, it does not represent any one definite condition either clinically or microscopically. It is even applied to bands and membranes in the vitreous that have no connection with the retina, although it should be reserved for the fibrous bands and membranes that distinctly spring from the retina or optic disc, and while they may project to a greater or less extent into the vitreous yet spread out for the most part into the retina.

Judged from this point of view, the present case may also be included under retinitis proliferans. For the greenish-white mass, that stands out from the retina over the upper edge of the disc, with its irregular surface and numerous new-formed vessels can only be a connective-tissue formation, as to the origin of which we can of course only come to a probable conclusion by comparing it with cases that have been examined microscopically. Although among all the many cases that I have observed I have never yet seen one without haemorrhages in the earliest stage of its development, I do not believe that retinitis proliferans is essentially organised extravasation. The formation of connective-tissue can apparently only be derived from pre-existing connective-tissue elements in the retina. Still I agree with Römer in his view that that new-formation may be of different origin. Müller's fibres and the connective-tissue sheaths of the vessels will come into consideration in the first place in this respect. Purtscher rightly drew attention to the frequent occurrence of a pathological condition of the vessels in typical cases of retinitis proliferans<sup>\*)</sup>. The present case affords, I think, further proof of this view. With the exception of one vein the superior retinal vessels are all obliterated. This stage was preceded 2½ years ago by retinal haemorrhages which, considering their distribution and the arteriosclerosis present, were conclusive proof of degenerated vessels over a definite area. Although appearances suggested a thrombosis of the superior temporal veins at the first ophthalmoscopic examination, it must still remain an open question whether this was a case of thrombosis of the above-mentioned veins or of the corresponding arteries with secondary affection of the veins, inasmuch as it was impossible to follow the various stages of its development. In any case one can understand how, when sclerosis of the arteries was present and sclerosis of the veins probable, the superior retinal vessels became subsequently completely obliterated. The mere proof of

an affection of the vessels, however, does not offer any explanation of the proliferation of the connective-tissue in their sheaths. The cases of retinitis proliferans that have hitherto been examined microscopically entitle us to assume that the formation of new connective-tissue in the optic disc or adjoining retina owes its excessive development to various pre-existing elements. Recurrent haemorrhages undoubtedly lead to some destruction in the elements of the retina even though it may not usually be great, and the glia of the supporting fibres of Müller then proliferates to take their place. Although such proliferation may not be as a rule considerable we are nevertheless bound to suppose that under special circumstances it may go on to an abnormally great extent.

How the connective-tissue of the sheaths of the vessels is also stimulated to growth in such cases is difficult to determine. Like other observers I have in several cases seen a remarkable number of new-formed vessels in the proliferating tissue, which in more advanced cases may partly disappear. The formation of new connective-tissue in the present case is characterised by an unusual abundance of vessels. Although it is quite obvious that young growing tissue requires a rich blood-supply for its development, the thought suggested itself whether the exciting cause of the proliferation of connective-tissue in the sheaths of the vessels does not lie in the very formation of so many new vessels from the walls of pre-existing capillaries in an area of vessels seriously affected with sclerosis. In the present case many important channels for the blood have been completely suspended owing to their obstruction. This development must be regarded as an attempt on the part of nature to cut out new ones for herself. New capillaries shoot off from capillaries that are still preserved, and small arteries and veins develop from these young capillaries by the outgrowth of muscle and elastic fibres from the older vessels over them. When there are changes in the optic disc and neighbouring retinal arteries whereby previous haemorrhages and destruction of tissues tend independently to lead to a proliferation of connective-tissue elements, a considerable development of connective-tissue from the vessel sheaths which have been stimulated by the growth of new vessels may also ensue. The position of the connective-tissue formation directly over the obliterated vessels at the upper edge of the disc points to the vessels being an important factor in its production. The new tissue-formation in this case has in part assumed an unusual shape. It is only in the upper half with its tense bands that it follows the typical form. The lower half has the appearance of a fine translucent membrane with numerous loops of vessels, hanging over the disc. This case strongly reminds one of the description and illustrations of vascularised new-formations in the vitreous given by Jaeger and others and more recently by Hirschberg<sup>\*)</sup>. The last-named author emphasises the fact that the loops of vessels, which develop in the course of haemorrhagic optic neuritis and retinitis and project into the fairly clear vitreous, are enveloped in an exceedingly fine, almost invisible fibrous-like membrane, so that there may be various gradations up to retinitis proliferans. The present case evidently represents one of those transition-forms.

<sup>\*)</sup> Cf. C. Tab. V. Part. II of this atlas.

<sup>\*)</sup> Hirschberg: On vascularised new-formations in the vitreous. *Centralblatt f. prakt. Augenheilk.* Sept. 1890.



anation  
s. The  
amined  
of new  
yes its  
current  
ements  
nd the  
o take  
e con-  
special

sels is  
rmine.  
rkable  
which  
ion of  
by an  
s that  
velop-  
of the  
s does  
n the  
iously  
chan-  
their  
pt on  
laries  
ll ar-  
out-  
over  
uring  
on of  
nnec-  
tissue  
y the  
con-  
at the  
ortant  
case  
upper  
The  
with  
ongly  
urised  
more  
e fact  
hagic  
eous,  
s-like  
initis  
those

entral-

C.

Erkrankungen der Netzh

Diseases of the Retina

---

Tab. XII.

DEGENERATIO MACULAE LUTEA

---



## C. Tab. XII.

### Degeneratio maculae luteae disciformis oculi sinistri.

D. J., 79 Jahre alt, Privatier, wurde am 12. VI. 03 in die Klinik aufgenommen. Nach seiner Angabe sei schon seit dem Herbst vorigen Jahres eine bedeutende Verminderung des Sehvermögens auf dem linken Auge eingetreten; das rechte Auge sei aber erst in der letzteren Zeit schlechter geworden.

An dem trotz seines hohen Alters äusserst rüstigen Manne konnte ausser einem Bronchialkatarrh keine wesentliche Erkrankung nachgewiesen werden.

Urin war frei von Eiweiss und Zucker.

Rechtes Auge:

S =  $\frac{6}{60}$ ; mit + 4 D. N. 8. Gesichtsfeld normal. In der Linse einzelne periphere Speichen und im Glaskörper feine bewegliche Trübungen. Paramacular eine Blutung von der Grösse der halben Papille mit mehreren anderen Hämorrhagien in der nächsten Umgebung. Temporal von der Papille einzelne kleine weissliche chorioiditische Herde.

Linkes Auge:

Finger in 50 cm erkannt. In der Linse ebenfalls feine periphere radiäre Trübungen; im Glaskörper Cholestearinkristalle. Der Hintergrund bietet das dargestellte Bild:

Der senile Sehnerv zeigt keine besondere Veränderung, auch nicht Zahl und Kaliber der Gefässe. Ein eigentümliches Bild weist aber die Macula lutea und ihre Umgebung auf. Es fällt sofort ein grosser, annähernd runder, über  $2\frac{1}{2}$  PD betragender Herd auf von graugelblichweisser Farbe. Nur seine untere innere Grenze ist schärfer konturiert, sichelförmig, hellgelblichweiss und anscheinend leicht prominierend, während er in seiner übrigen Ausdehnung in gleichem Niveau mit der Netzhaut liegt und mit verschwommenen Rändern in das Rot des Hintergrundes übergeht. Der Herd bietet keine besondere Zeichnung; aber etwas nach aussen von seinem Zentrum verlaufen diagonal gestellt und parallel gereiht drei kurze weisse Streifen. Zu dem oberen, kürzeren dieser Streifen zeigen nun zwei einzelne Netzhautgefässe ein ganz bestimmtes Verhalten. Ein Zweig der Arteria temporalis inf. und Vena temporalis inf. verschwinden an seinem oberen Rande wie in einer seichten Furche plötzlich, ein dunkles Knie darstellend. Arterie wie Vene, an und für sich in ihrem ganzen Verlaufe schon breiter wie normale Makulargefässe, werden gegen ihr sichtbares Ende zu allmählich noch etwas breiter; eine Fortsetzung dieser Gefässe ist nirgends zu konstatieren. Es ist noch ein von unten und ein von oben kommendes Netzhautgefäss, äusserst schwer wahrnehmbar, bis zur bezeichneten Rinne zu verfolgen.

Ausserdem gewahrt man noch ein paar Netzhautgefässe, die über den inneren Rand des grossen Herdes treten, aber in ihrem weiteren Verlaufe kaum mehr zu verfolgen sind. Während an seinem oberen Rande nur einzelne graue Pigmentfleckchen wie verschleiert zu sehen sind, treten mehrere grauschwarze kleine Pigmentflecke schärfer konturiert im Bereiche der diagonalen weissen Streifen auf.

Nach 2 Jahren stellte sich der Patient wieder vor (22. VII. 05). Die grosse scheibenförmige Figur an Stelle der Macula lutea war nicht mehr vorhanden. In der Netzhautmitte sitzt nun ein ungleich kleinerer, gelblichweisser, nicht scharf begrenzter Fleck, in welchen zwei untere temporale Gefässe genau noch in der früher beschriebenen Weise eintauchen. Dicht um diesen Herd gruppieren sich mehrere, kleinere, gelblichweisse Fleckchen. In dem grösseren Plaque sowohl als zwischen den kleineren sind zahlreiche grau-

schwarze Pigmentfleckchen eingelagert. Das Pigment hat sich seit Darstellung des Bildes etwas vermehrt. — Auf dem rechten Auge besteht eine grössere horizontal gelagerte, spindelförmige, braunrote Blutung und darüber ein gelblichweisser Fleck mit grauen Pigmentpünktchen. Von oben herab zieht ein grösserer Ast der Vena temporalis superior, um noch stark von Kaliber scharf abgesetzt im gelblichweissen Plaque zu verschwinden.

Der abgebildete Hintergrund scheint wenigstens in dem vorliegenden Stadium eine seltene ophthalmoskopische Erscheinung darzustellen. Wenigstens habe ich in den mir zu Gebote stehenden Atlanten von Jäger, Liebreich, Magnus, Haab, Wecker, Adams Frost keine Abbildung gefunden, die Ähnlichkeit mit dem beschriebenen Falle hätte. In meinem Atlas der Ophthalmoskopie habe ich aber auf C. Tab. XXVII ein Bild dargestellt, das mit dem vorliegenden in den wesentlichsten Punkten sich deckt. Ich habe es als Chorio-Retinitis centralis bezeichnet, eine Auffassung, die ich aber an der Hand dieses neuen Falles rektifizieren muss. Ich habe für diesen die Bezeichnung: Degeneratio maculae luteae disciformis gewählt, weil damit über die Genese nichts präjudiziert ist.

Wie die Anamnese ergibt, ist der Befund schon älteren Datums. Die grosse makuläre Blutung des rechten Auges legt die Vermutung nahe, dass auch die Veränderung auf dem linken Auge in einer gewissen Beziehung zu wahrscheinlich vorausgegangenen makulären Blutungen stehen dürfte. Diese Annahme gewinnt an Berechtigung, wenn man den Fall von C. Tab. XVII meines Atlas der Ophthalmoskopie damit vergleicht. Die Lage der Herde, ihre Grösse, Farbe und Form bieten doch soviel Übereinstimmung, dass man beide Bilder für den Ausdruck ein und desselben Prozesses halten darf. In dem zitierten Falle ist aber der Herd noch von ausgedehnten älteren Blutungen umgeben, so dass unbedingt der Eindruck hervorgerufen wird, als ob dieselben in einem gewissen genetischen Zusammenhange mit dem grossen Herde stehen müssten. Darum ergibt sich von selbst die Vermutung, dass auch dem vorliegenden Herde Hämorrhagien zu grunde liegen dürften, wenn auch zurzeit keine Blutungen mehr nachweisbar waren. Die Pigmentherde sind ja wohl ein weiterer Beweis. Wenn es auch selten ist, dass aus Netzhautblutungen ophthalmoskopisch nachweisbares Pigment sich entwickelt, so ist es gleichwohl eine bekannte Sache, dass bei reichlichen Blutungen hämatogenes Pigment in einzelnen Schollen oder in Gruppen von solchen in der Netzhaut sich bilden kann. — Das momentan vorliegende Stadium ist offenbar grossen, wahrscheinlich öfter rezidivierenden Blutungen gefolgt, die bei dem hohen Alter des Patienten und der höchst wahrscheinlich bestehenden Erkrankung kleinerer Gefässe nichts überraschendes haben können. Das zarte Gewebe der Macula wurde durch sie in grösserer Ausdehnung zertrümmert. Der grosse makuläre Herd ist demnach allem Anscheine nach nur als ein nekrotischer Bezirk aufzufassen, teils aus abgestorbenen Netzhautelementen, teils aus Fibrin bestehend. Dieses Stadium scheint monatelang bestehen bleiben zu können. Wie alles tote Gewebe wirkt aber auch dieser nekrotische Herd als Fremdkörper, den der Organismus zu eliminieren und durch lebendes Gewebe zu ersetzen sucht. Auf chemotaktischem Wege werden weisse Blutzellen angelockt, die als Phagocyten wirkend das abgestorbene Gewebe zur Resorption bringen. Die gelblichweissen Flecke, die jetzt nach zweijähriger Dauer der Erkrankung





*J. Oeller pinor*

Degeneratio maculae luteae disciformi



LDOUT BLA



an Stelle des scheibenförmigen Herdes zu sehen sind, dürften grösstenteils aus solchen Phagocytengruppen gebildet sein. Hand in Hand mit der Aufsaugung der Zerfallsprodukte entwickelt sich von der Umgebung des Herdes aus eine Neubildung von Bindegewebe, das dazu bestimmt ist, das allmählich gänzlich verschwindende tote Gewebe zu substituieren. Auf die Entwicklung von pigmentierten Narben oder Bindegewebsschwarten nach massenhaften Extrakvasaten, die die Innenfläche der Netzhaut bedecken können, macht schon Leber\*) aufmerksam. Diese Metamorphose wird wahrscheinlich der dargestellte Fall auch noch eingehen, wie sie auch der Fall in C. Tab. XXVII meines Atlas durchgemacht hat, in dem schliesslich an Stelle des ursprünglichen Herdes eine grosse, strahlige, blendendweisse, stellenweise pigmentierte Narbe nachweisbar war.

Die beiden von mir beobachteten Fälle haben das Eigentümliche, dass makuläre Gefässe eine Verlaufsanomalie zeigen.

\*) Leber: Die Krankheiten der Netzhaut und des Sehnerven. Handbuch von Sämisch und Gräfe, 5. Bd., VIII. Kapitel, pg. 559.

D. J., aet. 79 years, gentleman, was admitted into the hospital on 12<sup>th</sup> June 1903. He stated that the vision in his left eye had failed considerably since the previous autumn, while the sight of his right eye had only recently become worse.

The patient was extremely active for his years, and apart from some bronchial catarrh showed no signs of any gross disease.

The urine contained neither albumin nor sugar.

Right eye: V. =  $\frac{6}{6}$ . c. + 4 D, N. 8. Field of vision normal: a few peripheral striae in the lens, and fine floating opacities in the vitreous. Close to the macula there was one haemorrhage about half as big as the disc, and several others in its vicinity. One or two small whitish patches of choroiditis were seen on the temporal side of the disc.

Left eye: V. = fingers at 50 cm. Fine peripheral radiating striae similar to those in the right eye were present in the lens; cholesterin crystals in the vitreous. The fundus presents the condition here reproduced:

There is no particular change discernible either in the senile optic disc or in the number and size of the vessels. The macular region, however, exhibits a curious condition in the form of a large disc-shaped figure of a greyish yellow-white colour, whose diameter is  $2\frac{1}{2}$  times that of the optic disc. It presents a clean-cut edge only at its lower and inner part where it has a crescent-shaped, light yellowish-white appearance, and is apparently slightly raised; in the rest of its extent, however, it lies on the same plane as the retina and merges gradually into the red of the fundus. This area does not show any special design; but a little to the outer side of its centre three short white bands running diagonally and parallel to each other are seen. Now the uppermost of these bands has a very definite relation to two retinal vessels, branches from

Der Fall C. Tab. im vorliegenden temp. inf. und des Herdes, oh Beide Gefässe hautgefässe die ich auch schon ophthalmoskopis albumin. Es grössere Blut besonders zarte Gefässverlaufs wachung zwisc gefässe in die haut einspriess Anomalien noch suchung aber g

visible at its up dots in the reg

The patie The large disc its place there with ill-defin temporal vesse above-described round this pat lying in the la ones. The pig plate was pain haemorrhage s above it a yell branch of the siderably reduc

This fund at least in the cannot find one hand, viz. thos Adams Frost. a picture is g essential featur in the light o For this case I disciformis", be of the case.

The histo The large mac that the chang tion with ha



morrrhages give rise to pigment that is visible with the ophthalmoscope, it is nevertheless well known that, when the haemorrhages are very extensive, haematogenous pigment may develop in the retina in the form of patches either discrete or in groups.—The stage reproduced in this plate has evidently followed large, probably frequently recurring haemorrhages which, considering the patient's great age and the probability that the smaller vessels were diseased, are not surprising. The delicate tissue of the macula over a large area was destroyed by them. The large figure at the macula, therefore, should evidently be regarded as an area of necrosis, composed partly of dead retinal elements partly of fibrin. This stage can apparently continue for many months. Like all dead tissue, however, it acts as a foreign body which the organism endeavours to throw off and replace by living tissue. Leucocytes are attracted by chemotaxis, and acting as phagocytes they bring about the absorption of the necrosed tissue. The yellowish-white spots which are now visible in the position of the disc-shaped figure after two years are very possibly largely made up of clumps of these phagocytes. Simultaneously with the absorption of the products of degeneration new connective tissue begins to develop from the neighbourhood of the figure, this tissue being destined to take the place of the dead matter which gra-

dually disappears. Leber\*) draws attention to the development of pigmented cicatrices or layers of connective tissue after large extravasations, which may cover the surface of the retina. This change will probably take place in this case as it did in that in C. Tab. XXVII of my atlas, where a large shining-white cicatrix with striated edges and spots of pigment here and there could ultimately be seen in the place of the original figure.

The two cases that I have observed have this peculiarity that the macular vessels have an abnormal course. The case C. Tab. XXVII showed an arterio-venous anastomosis, and in this case a macular branch from the inferior temporal artery and vein suddenly disappears about the centre of area, and no trace of them can be seen beyond this point. Both these vessels are much larger than other retinal vessels in this region. A very similar condition has already been depicted in C. Tab. III of this atlas from a case of albuminuric chorio-retinitis. Patches of exudation extending deep in the tissues or large haemorrhages at the macula, as the case may be, that destroy the layers of the retina which is specially delicate in this region seem to predispose to abnormalities in the course of the vessels in this way, that adhesion takes place between the retina and choroid, and vessels from the latter layer may grow into the former and even vice versa. Abnormalities of this kind have been hitherto very rarely seen with the ophthalmoscope, although they have from time to time been observed microscopically.

\*) Leber: The diseases of the retina and optic nerve. Handbuch von Saemisch und Graefe. Vol. 5: Chap. 8. p. 559.



velopment  
fter large  
na. This  
n that in  
e cicatrix  
ere could

eculiarity  
The case  
and in  
tery and  
no trace  
ssels are

A very  
I of this  
tches of  
hages at  
s of the  
redispose  
that ad-  
vessels  
ven vice  
y rarely  
time to

C.

Erkrankungen der Netzhaut

Diseases of the Retina

---

Tab. XIII.

AMOTIO RETINAE SANATA; SCLEROTICAE;  
CHORIOIDEAE; STRIAE SUBRETINAE;  
PIGMENTI; ATROPHIA NERVI OPTICI

---



## C. Tab. XIII.

Amotio retinae sanata; sclerosis vasorum chorioideae; striae subretinales; proliferatio pigmenti; atrophiea nervi optici oculi dextri.

G. M., 51 Jahre alt, Wäscherin, stellte sich am 18. VIII. 02 vor mit dem Ersuchen, ihr für die Nähe eine Brille zu ordinieren. Ganz zufällig wurde bei dieser Gelegenheit die fast völlige Erblindung des rechten Auges konstatiert, für welche sie kein ursächliches Moment anzugeben wusste. Der Befund ist sich bis jetzt vollkommen gleich geblieben. Pat. steht in Behandlung der gynäkologischen Klinik wegen Peri- und Parametritis posterior und mässiger Endometritis, Schmerz in der Gallenblasengegend. Urin frei von Eiweiss und Zucker.

Der Befund am Auge ist folgender:

Linkes Auge: Emmetropie; S.  $\frac{6}{60}$ . Pr. 1,5 D. Nr. 1. Hintergrund vollkommen normal.

Rechtes Auge: Finger in  $\frac{1}{2}$  m; Gesichtsfeld zeigt einen vollkommenen Defekt nach oben; nach unten ist ein grösserer Teil des Gesichtsfeldes erhalten, aber mit beträchtlicher nasaler und temporaler Einschränkung.

Zarte, punktförmige Cataracta polaris post. Glaskörper vollkommen klar. Der runde Sehnerv ist nach allen Seiten scharf begrenzt durch den Scleralring; die temporale Hälfte ist hellgrauweiss; die nasale mehr graugrün. Die obere Sehnervenhälfte weist die normale Zahl von Gefässen auf, die allerdings etwas verschmälert sind und keine Reflexstreifen zeigen. In der unteren Hälfte fehlen kleinere Gefässe überhaupt. Die Arteria temporalis und nasalis inferior sind zu ganz dünnen Fäden reduziert. Auch die eine von unten kommende Vene ist bedeutend verschmälert. Sofort in die Augen springend ist das ganz verschiedene Verhalten der oberen und unteren Partien des Augenhintergrundes. In der oberen Hälfte ist das Retinalepithel vollkommen erhalten. Durch das normale Hintergrundsrot sieht man nur da und dort Aderhautgefässe mit dunkeln Intervaskularräumen durchschimmern. In der unteren Hälfte dagegen fehlt das Retinalepithel vollkommen, so dass die Aderhautgefässe mit dem dunkeln Stroma nackt zutage liegen. Nasalwärts vom Optikus geht die Grenze zwischen erhaltenem und defektem Retinalepithel bogenförmig etwas über den oberen Papillenrand hinaus; temporalwärts dagegen schneidet die Grenze mit einer ziemlich scharf gezogenen horizontalen Linie ab. In der ganzen unteren Hälfte des Hintergrundes sind es vor allem sämtliche Aderhautgefässe, die durch ihr Verhalten auffallen. Normale Aderhautgefässe sind überhaupt nicht mehr zu sehen. Die kleineren sind in scheinbar solide gelblichweisse oder weissrötliche, gleichmässig glattwandige Stränge verwandelt. An den grösseren Aderhautgefässen ist der zentral verlaufende rote Blutfaden zu beiden Seiten mehr oder minder breit, aber stets in gleichmässiger Ausdehnung weiss eingescheidet. Die Gefässzwischenräume erscheinen schokoladebraun; weisse atrophische Herde im Stroma sind nirgends zu konstatieren. Neben der Sklerose der Aderhautgefässe fallen sehr zahlreiche intensiv schwarze Pigmentherde auf, die regellos in der unteren Hälfte des Hintergrundes bis in die äusserste Peripherie zerstreut liegen. Sie zeichnen sich neben der Verschiedenheit ihrer Grösse vor allem durch ihre Polymorphie aus. Neben kleinen Pigmentpünktchen finden sich grössere eckige oder rundliche, auch halbkreisförmige Schollen. Zahlreiche grössere Pigmentherde namentlich in den mehr peripheren Partien haben mehr minder lange Fortsätze. Besonders auffallend sind aber vereinzelte, sehr lang gestreckte, ziemlich breite Pigmentstreifen, die in ihrer Längsachse einen grünlichweissen Streifen aufweisen können. Ein solcher Pigmentherd liegt im Bilde gerade nach unten aussen vom Sehnerv. Die Pigmentherde zeigen kein besonderes Verhältnis zu den Netzhautgefässen, wenn es wohl auch sicher ist, dass einzelne von ihnen bereits in die Netzhaut eingedrungen sind.


Einen weiteren besonders prägnanten Befund stellen noch lange, schmale, grünlichweisse Stränge dar (Striae subretinales). Drei fallen besonders in die Augen. Einer verläuft von der Mitte der nasalen Papillengrenze nach oben innen und stellt auf eine längere Strecke die Grenze zwischen normalem und pathologisch verändertem Hintergrunde dar (im Bilde ist bloss noch das papillare Ende zu sehen). Zwei streichen temporalwärts ebenfalls am Rande der normalen und erkrankten Zone des Fundus. Der obere von diesen beiden Streifen ist der schmälere und kürzere. Er ist sehr scharf gerändert und an seinem inneren Ende von einem grösseren Pigmentherde umgeben. Der untere, längere und breitere

entwickelt sich mit verschwommenen Rändern schon in der Nähe des äusseren Papillenrandes und streicht dann scharf konturiert in einem leicht geschweiften Bogen temporalwärts. In einem grossen Teil seines Verlaufes ist er beiderseits schwarz pigmentiert. Eine Netzhautvene, die ihn ein paarmal überkreuzt, zeigt an den betreffenden Stellen keine Verlaufsanomalie.

Bei dem Mangel jeglicher anamnestischer Anhaltspunkte bietet das geschilderte ophthalmoskopische Bild der Erklärung manche Schwierigkeiten. Der nächst liegende Gedanke ist ja wohl, eine Chorio-Retinitis, resp. eine Ernährungsstörung in der Netzhaut anzunehmen auf Grund einer bestehenden Sklerose der Aderhautgefässe. Gegen diese Annahme spricht aber die höchst eigentümliche Verbreitung und Beschränkung der Sklerose nur auf die untere Hälfte der Aderhaut. Gefässdegenerationen breiten sich doch nach der anatomischen Zusammengehörigkeit der Gefässe aus, so dass wohl zwischen Bezirken mit normalen Gefässen Gruppen erkrankter Gefässe sich bilden können, aber keine so grosse Zone mit so scharfer, horizontaler Trennungslinie. Die Scheidung des Hintergrundes in eine obere Hälfte mit erhaltenem Retinalepithel und eine untere Hälfte mit zu Grunde gegangener Epithelschicht und die manchen Autoren für pathognostisch geltenden Striae subretinales müssen den Gedanken erwecken, dass eine Netzhautablösung dem ganzen Prozesse vorausgegangen ist, die entweder schon ursprünglich die untere Hälfte der Netzhaut betroffen oder später nach unten sich gesenkt hatte und zur Ausheilung gekommen ist. Das Zugrundegehen einerseits des Retinalepithels, andererseits seine Wucherung in dem von der Ablösung betroffenen Bezirke sind ja bekannte Erscheinungen nach Spontanheilung einer Netzhautablösung. Manche Diagnose von Chorio-Retinitis ist sicherlich unter die Rubrik einer geheilten Amotio einzureihen, deren Bild sehr wechselläufig sein kann. Was im gegebenen Falle aber doch, ganz abgesehen davon, dass die Anamnese nicht den geringsten Anhaltspunkt hierfür bot, Bedenken gegen die Auffassung des Prozesses als einer geheilten Amotio erwecken muss, ist die über die ganze untere Hälfte der Aderhaut gleichmässig verbreitete Sklerose der Aderhautgefässe. Es kann ja nichts Überraschendes haben, dass in manchen Fällen geheilte Ablösung neben Pigmentierung des Hintergrundes sklerotische Aderhautgefässe gefunden werden. Den meisten Fällen liegt ja eine Aderhauterkrankung zu Grunde, die selbstverständlich auch zu einer Erkrankung der Gefässe führen oder sogar durch eine solche bedingt sein kann. Als sehr auffallende Erscheinung muss es aber bezeichnet werden, dass nach Spontanheilung einer Ablösung in dem von derselben betroffenen Bezirke alle Aderhautgefässe sklerotisch gefunden werden. Dieser Umstand machte mich in der Auffassung des geschilderten Falles etwas unschlüssig, bis mir der Zufall einen weiteren unzweideutigen Fall in die Hand spielte. Es handelt sich um einen 63jährigen Ökonomen M. H., der als Soldat im Kriege 1870 durch eine explodierende Granate zu Boden geschleudert wurde. Aus der Betäubung erwacht war er auf beiden Augen fast vollkommen erblindet. Nach fünf Tagen wurde er nach Göttingen transportiert, wo Prof. Schweigger eine Netzhautablösung beider Augen konstatierte, wie aus den vorliegenden Militärakten zu ersehen ist. In den Jahren 1882 und 1883 stellte er sich wiederholt in der hiesigen Universitäts-Augenklinik vor. In den poliklinischen Journalen findet sich als Diagnose: Chorio-Retinitis.

Gegenwärtig erkennt das rechte Auge bloss Finger in  $\frac{1}{3}$  m; das linke hat S.  $\frac{6}{60}$ . Gesichtsfeld nach oben vollständig fehlend. Beiderseits besteht sternförmige Cataracta polaris posterior; Glaskörper klar. Papille leicht atrophisch mit etwas engeren Arterien und Venen. Sonst bietet der Hintergrund beider Augen genau die gleichen Verhältnisse wie der abgebildete. Wie bei diesem ist in der oberen Hälfte das Retinalepithel intakt, in den unteren dagegen vollkommen fehlend. Die Trennungslinie ist noch scharfer gezogen und läuft nasal wie temporal fast genau horizontal. In der ganzen unteren Hälfte des Hintergrundes sind sämtliche Aderhautgefässe sklerotisch. Neben ziemlich ausgedehnter polymorpher Pigmentwucherung sind auch langgestreckte Striae subretinales vorhanden, die nur nicht am oberen Rande der epithelentblösten Stelle hinstreichen, sondern weiter davon entfernt gegen die äquatorialen Partien in diagonalen Richtung ziehen.





J. Oeller pinx.

Amotio retinae sanata, Sclerosis vasorum chorioideae, Stria  
Proliferatio pigmenti, Atrophia nervi optici.



OLDOUT BL



Nachdem in diesem Falle von autoritativer Seite unmittelbar nach dem Trauma doppelseitige Netzhautablösung konstatiert worden war, dürfte es wohl kaum einem Zweifel unterliegen können, dass der gegenwärtige Zustand als geheilte Netzhautablösung aufgefasst werden muss. Die Anlegung der Netzhaut war offenbar schon 1882, als die Diagnose Chorio-Retinitis gestellt wurde, perfekt gewesen. Das Bild in diesen drei beobachteten Augen ist ein so frappierend übereinstimmendes, dass auch für den abgebildeten Fall wohl eine vorausgegangene Netzhautablösung als Ursache angesehen werden muss.

Wahrscheinlich ist, wenn auch anamnestiche Anhaltspunkte dafür fehlen, derselbe auch traumatischer Natur gewesen, wie der zweite mitgeteilte Fall, für welchen bei der Jugend des Pat. eine besondere Disposition für eine Sklerose der Aderhautgefäße sicher nicht in Betracht kommen kann. Wenn aber auch das Zugrundegehen des Retinalepithels in der ganzen Ausdehnung der Ablösung und die herdweise Wucherung des Pigmentes, die Striae subretinales, die Netzhaut und Sehnervenatrophie an der Hand des bis jetzt bei Spontanheilung einer Amotio vorliegenden anatomischen Materials genügend erklärt werden kann\*, so dürfte doch eine be-

\* 1. Möglich: Über Spontanheilung der Netzhautablösung. Inaug.-Dissertation, Marburg 1891.

friedigende L. Ausdehnung noch nicht geg dieselbe einse erst nach erf der Druck de Chorioidea die kommen ausg hydrostatische ausgesetzt sei

2. Axen f retinae. Bericht i berg, pag. 192.

3. Heine: schen Augen. 27.

4. Uth o die 31. Versamm

5. Öller: seitiger Heilung für Augenheilkur

G. M., aet. 51 years, washerwoman, came to the clinic on 18. VIII. 02 wanting a pair of glasses for close work. It was then quite accidentally discovered that her right eye was almost completely blind; she was unable to account for this condition, which has remained unchanged up to the present time. The patient is under treatment in the gynaecological department for perimetritis and parametritis posterior, endometritis, and pain over the gall-bladder.

The urine was free from albumin and sugar.

The condition of her eyes was as follows:

Left eye: Em. V. =  $\frac{6}{6}$ ; Pr. 1.5 D: N. 1. Fundus quite normal.

Right eye: V. = fingers at  $\frac{1}{2}$  metre: the upper part of the field of vision is completely lost, a great part of the lower half is preserved, although considerably contracted on its nasal and temporal side. Posterior polar cataract in the form of fine dots. Vitreous perfectly clear. The optic disc is sharply defined by a complete scleral ring: its temporal half is light grey-white in colour, while on the nasal side it is more of a greyish-green tint. The upper half of the disc shows the usual number of vessels; they are slightly contracted and show no light-reflex. In the lower half there is an entire absence of smaller vessels. The inferior temporal and nasal arteries are reduced to mere threads. The inferior vein is also considerably contracted. One is immediately struck with the marked difference in the appearance of the upper, from the lower, half of the fundus. In the former the retinal epithelium is preserved intact; only here and there can choroidal vessels with dark interspaces be faintly seen through the normal red of the fundus. In the latter, however, the retinal epithelium is entirely absent, the choroidal vessels with the stroma being thus exposed to view. On the nasal half the line of demarcation between the parts with and without the retinal epithelium layer runs in a curve over the upper margin of the disc; on the temporal side, however, it takes a fairly straight horizontal course. In the lower half of the fundus the most striking feature is the condition of all the choroidal vessels. Normal choroidal vessels cannot be seen anywhere. The smaller vessels have been converted into solid yellowish-white or whitish-red cords with uniformly smooth walls;

The pigment retinal vessels have already

Another greenish-white specially notice of the disc up stance the di the fundus (in Two run tow line of demarc fundus. Of th has very sha large patch o broader, begin the papilla, b the temporal of its course A retinal vei normality as

In the of the picture first thought nutrition of t that is presen distribution a the choroid. their anatomic form between field with a destruction of two halves a as pathognom cess has follo affected the and become on the one ha detachment o



after it has become spontaneously cured. This made me somewhat doubtful about accepting such an explanation in this case, until another undoubted case accidentally came under my notice. This was a farmer M. H. aet. 63 years, who when serving as a soldier in the war of 1870 was knocked down by an exploding shell. When he recovered consciousness he found he was almost totally blind in both eyes. Five days afterwards he was taken to Göttingen, when Prof. Schweigger found a detachment of the retina in both eyes, as the army records of the time testify. During the years 1882 and 1883 he was seen repeatedly at this clinic. The diagnosis of his case in the hospital notes is "chorio-retinitis".

Now he can only count fingers at  $\frac{1}{3}$  metre with the right eye: in the left the vision =  $\frac{6}{60}$ . The upper part of the field of vision is entirely gone. Both eyes show a star-shaped posterior polar cataract: vitreous clear. The optic is slightly atrophic: arteries and veins are somewhat contracted. Otherwise the condition of the fundus in both eyes is exactly the same as that just described. The retinal epithelium in the upper half is, as in the present case, still intact, while in the lower it is completely absent. The line of demarcation between the two is even sharper, and runs almost exactly horizontally on the nasal as well as on the temporal side. The choroidal vessels over the entire lower half of the fundus are sclerosed. There is fairly extensive proliferation of pigment the patches of which vary in shape. Long subretinal striae are also present, only they do not keep to the upper margin of the area denuded of its retinal epithelium but run in a diagonal direction towards the equator at some distance from it.

When now a double retinal detachment was made out, in the case just cited, by a competent authority immediately after the injury, there can hardly be any doubt that the present condition must be regarded as a healed retinal detachment. The replacement of the retina was evidently complete as far back as

1882 when it was diagnosed chorio-retinitis. There is such a striking similarity of the fundus in those three eyes that the condition in the present case must surely have been the result of a previous detachment of the retina.

Although there is no history to indicate that this case was of traumatic origin it was probably so, like the other case described in which considering the age of the patient the possibility of any special tendency to sclerosis of the choroidal vessels can positively be excluded. Still although a sufficient explanation of the destruction of the retinal epithelium over the whole extent of the detachment, the patches of pigment, the subretinal striae, and the atrophy of the retina and optic nerve can be obtained from the records\*) of the microscopical examination of spontaneous cure of detachment, a satisfactory solution of the sclerosis of the choroidal vessels corresponding to the area of the original retinal detachment is not yet forthcoming. We do not know when this begins, whether it was when the retina was still detached or after it had returned to its place. The idea that the pressure of the subretinal fluid on the choroid behind it might lead to this change in the walls of the vessels must be absolutely rejected, since equal pressure must, in accordance with hydrostatic laws, be exerted on every point within the globe.

\*) 1. Möglich: On the spontaneous cure of retinal detachment. Inaugural dissertation, Marburg, 1891.

2. Axenfeld: Specimens of the spontaneous cure of a haemorrhagic detachment of retina. Report of the 25th Ophthalmological Congress in Heidelberg, p. 192.

3. Heine: Demonstration of microscopic specimens of high myopic eyes. 27th Ophthalmological Congress, Heidelberg, p. 328.

4. Uhthoff: On the replacement of detached retina. 31st Ophthalmological Congress, Heidelberg, p. 4.

5. Öller: A case of bilateral metastatic carcinoma of the choroid and bilateral retinal detachment with healing of the latter in the right eye. Archiv für Augenheilk. Vol. 52, p. 102.



such a  
the con-  
ult of a

use was  
ase de-  
ssibility  
els can  
tion of  
tent of  
e, and  
d from  
as cure  
of the  
retinal  
en this  
hed or  
essure  
to this  
ected,  
ws, be

augural

gie de-  
Heidel-

eyes.

logical

id and  
Archiv

D.

Erkrankungen der Ader

Diseases of the choro

---

Tab. I.

SCLEROSIS VASORUM CHO

---



## D. Tab. I.

### Sclerosis vasorum chorioideae oculi dextri.

D. A., 52 J. alt, Bauersfrau, angeblich früher stets gesund, erkrankte vor 5 Jahren zuerst auf dem linken Auge. Sie befand sich vom 4. II. bis 2. III. 97 in stationärer Behandlung der hiesigen Klinik. Das rechte Auge war funktionell und ophthalmoskopisch vollkommen normal.

Das linke Auge hatte eine Sehschärfe von  $\frac{6}{18}$ ; Lichtsinn bedeutend herabgesetzt; Gesichtsfeld eingengt: o  $15^\circ$ , u  $50^\circ$ , i  $25^\circ$ , au  $40^\circ$ . Die Spiegeluntersuchung ergab eine leichte diffuse Glaskörpertrübung, temporal vom Opticus zwei umschriebene und mehrere diffuse chorioiditische Herde bis zur Macula hin. Vom 26. IV. bis 15. V. 97 befand sich Pat. wieder in der Klinik. Es waren auf dem linken Auge Präzipitate an der hinteren Hornhautwand und zahlreiche hintere Synechien aufgetreten. Die Rarefizierung des Pigmentepithels hatte zugenommen. Pat. machte eine Inunktions- und Jodkalikur durch. Sie stellte sich erst wieder am 25. XI. 02 vor mit der Klage, dass in den letzten Wochen auch die Sehkraft des rechten Auges ganz bedeutend abgenommen habe.

Die Untersuchung ergab:

Rechtes Auge:

Finger in  $1\frac{1}{2}$  Meter gezählt; Korrektur nicht möglich. Geringe periphere Gesichtsfeldeinengung; ein annähernd horizontalovales zentrales Skotom: au  $10^\circ$ , i  $20^\circ$ , o  $5^\circ$ , u  $8^\circ$ ; ausserdem ein kleines Skotom oben innen zwischen  $20^\circ$  und  $30^\circ$  und aussen unten zwischen  $30^\circ$  und  $40^\circ$ . — Auge äusserlich ohne Anomalie. Pupille rund, gut reagierend. Brechende Medien, auch Glaskörper vollkommen rein.

Ophthalmoskopischer Befund:

Sehnerv zeigt an seinem temporalen und nasalen Rande eine seichte Einkerbung. Er ist scharf kontouriert, von normaler Farbe. In der Zahl und dem Kaliber der Gefässe und dem Verhalten der Gefässwandungen ist nicht die geringste Anomalie zu konstatieren. Ein sehr wechselvolles Verhalten bietet das Retinalepithel. Stellenweise z. B. hart um den Sehnerveneintritt und nach oben aussen im Bilde ist dasselbe intakt, sodass Aderhautgefässe nicht sichtbar sind; aber zwischen Partien mit erhaltenem Epithel liegen Inseln, in welchen das Epithel rarefiziert oder ganz zu grunde gegangen ist. In grosser, zusammenhängender Ausdehnung fehlt das pigmentierte Epithel gerade unterhalb der Papille und nach aussen von derselben um die macularen Partien herum, sodass das ganze Konvolut der Aderhautgefässe mit den tiefgrau-roten Intervascularräumen frei zu Tage liegt. Die meisten Aderhautgefässe bieten ophthalmoskopisch noch normale Wandungen und Kaliber. Aber namentlich in der Verlaufsrichtung der Arteria temp. inf. sind schon ganze Knäuel sklerotischer Aderhautgefässe anzutreffen. Der gleiche Degenerationsprozess hat auch Gefässe oberhalb und unterhalb der Papille und in der Netzhautmitte befallen.

Grössere Gefässe sind auf mehr minder lange Strecken auf einer oder beiden Seiten weiss eingescheidet. Die Einscheidung ist entweder eine gleichmässige oder eine in rasch sich folgenden Zwischenräumen sehr unregelmässige, so dass die Blutsäule keinen glatten Zylinder mehr darstellt. Grössere Gefässe können nach Umständen eigentümlich knorrig und zackig erscheinen, namentlich wenn von ihnen abzweigende kleinere Gefässe auf kurze Strecken ebenfalls schon weisse Wandungen haben. Die kleineren Aderhautgefässe sind in den betreffenden Inseln in weisse oder gelblichweisse Fäden und Stränge verwandelt, die stellenweise ebenfalls ganz unregelmässige Kontouren zeigen können, namentlich an Überkreuzungspunkten. An solchen Stellen kann man selbst an sonst noch gesunden Aderhaut-

gefässen da und dort schon einen unregelmässig gestalteten weissen Fleck sehen. Nur an äusserst wenigen Stellen hauptsächlich in der Peripherie stösst man auf ganz kleine, intensiv schwarze, verschieden gestaltete Pigmentfleckchen ohne jede Beziehung zu den Netzhautgefässen.

Linkes Auge:

S =  $\frac{6}{18}$ ; mit  $-1$  Dioptr. =  $\frac{6}{18}$ ; mit  $+1$  D. N. 1 gelesen. Fast vollkommen normale periphere Gesichtsfeldgrenzen, kein Skotom. — Auf der Linsenvorderfläche einzelne feine Pigmentpünktchen; sonst Medien vollkommen rein. Sehnerv und seine Gefässe vollkommen normal, aber ausgedehnte Sklerose der Aderhautgefässe hauptsächlich temporal vom Sehnerv und sehr zahlreiche Pigmentflecke der verschiedensten Form und Grösse, ohne bestimmte Anordnung und Beziehung zu Netzhautgefässen.

Die interne Untersuchung ergab im Urin weder Eiweiss noch Zucker. Ganz geringe konzentrische Hypertrophie des linken Herzens, leichte Arterienspannung besonders am rechten Arm. Ozäna und Rhinitis; mässige Sattelnase; alteluetische Perforation des Nasenseptums.

Bei einer Wiedervorstellung der Patientin am 4. II. 04 wurde im Allgemeinen der gleiche Befund konstatiert; nur hatte sich unterdessen auch auf dem rechten Auge eine stärkere Pigmentwucherung entwickelt.

Die Sklerose der Aderhautgefässe ist durchaus keine seltene ophthalmoskopische Erscheinung. Sie kann spontan als selbständige Gefässdegeneration auftreten. Meist sind kleinere oder grössere Gruppen von Aderhautgefässen ergriffen, entweder hart um den Sehnerv oder gar so gerne in der Macula lutea. Bei der sogenannten senilen Maculaerkrankung spielt die Sklerose von Aderhautgefässen sicherlich eine gewisse Rolle.\* Sie löst keine entzündlichen Prozesse aus; bedingt aber infolge von Ernährungsstörung teils einen Schwund des Pigmentepithels an der betreffenden Stelle, teils eine meist sehr beschränkte Pigmentwucherung. Selbst eine ziemlich ausgedehnte Sklerose der Aderhautgefässe verträgt sich mit einem ophthalmoskopisch und funktionell normalen Verhalten der Netzhaut und ihrer Gefässe. — Sehr häufig ist die Sklerose der Aderhautgefässe sekundärer Natur, eine Begleiterscheinung entzündlicher Prozesse der Aderhaut. Es ist durchaus nicht so selten, dass bei einer gewöhnlichen Chorioiditis disseminata z. B. die Gefässcheiden sekundär an dem Entzündungsprozesse beteiligt sind.

Die Sklerose spielt eine wichtige aktive Rolle bei entzündlichen Affektionen der Aderhaut und Netzhaut. Das Bild der Chorio-Retinitis specifica ist bekannt. Mit höchster Wahrscheinlichkeit geht die Erkrankung von den Gefässen aus. Wenigstens darf es als Regel bezeichnet werden, dass von einem gewissen Stadium des Verlaufes an eine Sklerose der Aderhautgefässe ophthalmoskopisch sichtbar wird. Wenn auch Aderhaut und Netzhaut gleichmässig ergriffen zu sein scheinen, so macht klinische Erfahrung und anatomische Untersuchung es doch wahrscheinlich, dass der Prozess von der Aderhaut ausgeht und auf die Netzhaut übergreift.

Beide Membranen können aber auch unabhängig voneinander affiziert werden. Der vorliegende Fall, bei dem Lues mit Sicherheit nachgewiesen ist, dürfte ein sprechendes Beispiel hiefür

\*) Vergl. Harms: Anatomisches über die senile Maculaaffektion. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde XLII. Jahrg. I. Bd. Mai, pg. 448.





*J. Oeller, pinx.*

Sclerosis vasorum chorioideae.



**OLDOUT BLA**



sein. Auf dem linken Auge trat die syphilitische Affektion ausschliesslich in der Aderhaut mit entzündlichen Erscheinungen auf, die im weiteren Verlaufe sogar auf Corpus ciliare und Iris übergriffen. Aber trotz der ausgedehnten chorioidealen Gefässsklerose und Pigmentwucherung ist Netzhaut und Sehnerv ophthalmoskopisch und funktionell wenigstens, nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf dem rechten Auge spielte sich der syphilitische Prozess sogar ohne entzündliche Erscheinungen ausschliesslich an den Gefässen der Chorioidea ab unter dem Bilde der Sklerose. Bei dem gänzlichen Mangel von Beschlägen an der hinteren Hornhautwand, hinteren Synechien, Glaskörpertrübungen dürfen wir wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit entzündliche Zustände im Uvealtraktus ausschliessen. Da eine syphilitische Gefässerkrankung von einer gewöhnlichen Atheromatose nicht zu differenzieren ist, könnte man die Sklerose der Aderhautgefässe rechterseits für einen nicht spezifischen Prozess halten. Es muss doch auch als möglich bezeichnet werden, dass eine bei einem Syphilitiker vorhandene Gefässerkrankung nicht spezifischer Natur zu sein braucht. Wenn aber auf dem linken Auge der im wesent-

lichen gleiche ophthalmologische Erkrankung charakteristisch ist, so ist es doch das linke Auge für eine spezifische entzündliche Erscheinung. Diese Beobachtung ist bei beiden Augen ohne alle Gefässsklerose ausserhalb der Netzhaut. Nach Umschau in der Literatur ist viel zu wenig hingewiesen worden.

Als sehr auffällig ist, dass wenige Jahre nach der Affektion des rechten Auges auf dem linken sehr rasch sank, und dass es lange nicht die Ausdehnung des rechten war auch der Umstand, dass kleine schwarze Pigmentflecke, dass es, wie es auch auf dem ein paar Jahre dauerte.

D. A., 52 years of age, wife of a peasant, began to suffer in her left eye five years ago; previous to this, she stated, she had always enjoyed good health. She was admitted into this hospital and treated here from 4. II. to 2. III. 97. Her right eye was perfectly normal both as regards its visual acuity and ophthalmoscopic appearances.

The vision of the left eye was  $\frac{6}{18}$ ; light sense considerably diminished; visual field contracted, extending above  $15^{\circ}$ , below  $50^{\circ}$ , to the inner side  $25^{\circ}$ , to the outer  $40^{\circ}$ . Ophthalmoscopic examination revealed slight diffuse cloudiness in the vitreous, and on the temporal side of the disc two circumscribed and several diffuse spots of choroiditis as far as the macula. Patient was again in the hospital from 26. IV. to 15. V. 97. Deposits on the posterior surface of the cornea and numerous posterior synechiae had made their appearance in the left eye. The diminution of the pigment-epithelium had become more marked. She underwent a course of inunction and potass. iodide. She did not come up again till 25. XI. 02 when she complained that for the previous few weeks the sight of her right eye had become considerably worse.

Her condition was then as follows:

Right eye: V. = fingers at  $1\frac{1}{2}$  m., no improvement possible: slight contraction of the visual field peripherally: a central scotoma roughly horizontally oval in shape extending on the temporal side  $10^{\circ}$ , on the nasal  $20^{\circ}$ , above  $5^{\circ}$ , below  $8^{\circ}$ : besides, a small scotoma up and in between  $20^{\circ}$  and  $30^{\circ}$ , and down and out between  $30^{\circ}$  and  $40^{\circ}$ .—External appearances of the eye normal. Pupil circular, reacts well. Refractive media and vitreous perfectly clear.

Oph: The optic disc has a shallow notch on its temporal and nasal margins: it is sharply defined and of normal colour. Nothing

from ophthalmoscopic examination of their condition of their temporal artery was found. The vessels are similarly affected.

The larger vessels on both sides for varying degrees becomes very irregular as a result that the blood supply. Some of the large vessels have a appearance, especially the choroidal vessels which are yellowish-white through a very irregular opacity. At the points of constriction here and there are normal. In only ophthalmology, can one see these shapes without any doubt.

Left eye: V. = fingers at 1 m. The field of vision is no scotoma. Anterior surface of the optic disc and extensive sclerosis on the side of the disc and of sizes having no vessels.



are affected in larger or smaller groups either close round the disc or indeed very often at the yellow spot. In senile changes at the macula sclerosis of the choroidal vessels undoubtedly plays a certain part\*). There are no symptoms of inflammation; but as a result of an impairment of nutrition there ensues a disappearance of the pigment-epithelium at the part affected on the one hand, and on the other an usually very limited proliferation of pigment. Sclerosis of the vessels in the choroid may be fairly extensive and the retina and its vessels still remain normal both in appearance and function.—This condition of the choroidal vessels is very often secondary in nature, following inflammation of the choroid. In ordinary disseminated choroiditis, for example, it is not at all uncommon for the sheaths of the vessels to become secondarily affected.

Sclerosis plays an important active part in inflammatory affections of the choroid and retina. The appearance of specific chorio-retinitis is well known. In all probability the disease starts in the vessels. At any rate it may be taken as the rule that from a certain stage of the disease onwards sclerosis of the choroidal vessels can be seen with the ophthalmoscope. Although the choroid and retina appear to be equally affected, clinical experience and the results of microscopic examination render it probable that the process begins in the choroid and then spreads to the retina.

Either of these layers may, however, become affected independently of the other. The present case in which luetic infection was proved beyond doubt is a good example of this fact. In the left eye this taint appeared exclusively in the choroid as an inflammation which later on spread to the ciliary body and iris.

---

\*) Cf. Harms: On the histology of senile affections at the macula. *Klin. Monatsb. f. A.* Year 47, May, p. 448.

But in spite of the extensive sclerosis of the choroidal vessels and the proliferation of pigment the retina and optic nerve have not been involved at least as far as their function and the ophthalmoscope indicate. In the right eye the syphilitic process ran its course without any inflammatory symptoms exclusively in the choroidal vessels under the form of a sclerosis. In the entire absence of any precipitates on the posterior surface of the cornea, posterior synechiae, or vitreous opacities we may assume that in all probability there was no inflammation throughout the uveal tract. Since it is impossible to distinguish syphilitic vasculitis from ordinary atheroma, the sclerosis of the choroidal vessels in the right eye might be regarded as non-specific. It is certainly possible for vascular affections to occur in a syphilitic subject and yet not necessarily be syphilitic in character. When however the left eye shows a process, that appears with the ophthalmoscope essentially similar, running its course with symptoms characteristic of a specific affection, it is natural to regard the process in the right eye as being also specific in character, although there were never any signs of inflammation throughout its whole course. This observation makes it also probable that a specific sclerosis may occur in the choroid alone in both eyes without any inflammatory symptoms. A review of the literature leads me to think that too little notice has been taken of this point.

It must seem very extraordinary that the disease in the right eye did not appear till five years after it began in the left, and that the vision sank very rapidly from the onset, although the ophthalmoscopic signs were for a long time less widespread than they were on the left. It was also surprising that only a very few small black pigment-spots were visible in the fundus at first and that, as is common in specific chorio-retinitis, it was two years before the pigmentation became marked.



essels and  
have not  
ophthal-  
s ran its  
y in the  
ntire ab-  
e cornea,  
e that in  
he uveal  
vasculitis  
essels in  
is cer-  
litic sub-  
When  
with the  
th sym-  
o regard  
nacter,  
roughout  
e that a  
th eyes  
terature  
of this

in the  
the left,  
although  
bad than  
a very  
at first  
vo years

D.

Erkrankungen der Ader

Diseases of the choro

---

Tab. II.

RUPTURA CHORIOIDEAE DIRECTA; F  
VITREAE; AVULSIO CHORIOIDEAE

---



## D. Tab. II.

### Ruptura chorioideae directa; fissurae laminae vitreae; avulsio chorioideae papillaris oculi sinistri.

Am 27. XII. 04 zeigte dem 18jährigen Dienstknecht W. L. ein Freund einen kleinen Revolver. Durch unvorsichtige Handhabung entlud sich die Waffe und die Kugel drang in die linke Augenhöhle ein. Bei der Aufnahme des Pat. in die Klinik am 28. XII. wurde durch eine Röntgendurchleuchtung ein runder Schatten nachgewiesen, der in der Orbita nahe der temporalen Wand sass. Der übrige Befund war folgender:

Rechtes Auge: E; S =  $\frac{9}{6}$ ; äusserlich und ophthalmoskopisch normal.

Linkes Auge: Handbewegung in 1 Meter exzentrisch; Gesichtsfeld in der nasalen Hälfte fast ganz fehlend; Fixationspunkt bis zum  $10^\circ$  temporal in den Defekt einbezogen. Die Lider etwas geschwollen und blutig suffundiert. Nahe dem äusseren Augwinkel am untern Lidrand eine Kerbe. In den äusseren äquatorialen Partien der Conjunctiva bulbi und den oberflächlichen Schichten der Sklera zieht eine seichte, ziemlich lange Rinne nach rückwärts. Kornea und Vorderkammer, Iris, Linse und Glaskörper ohne Befund. Der Sehnerv mit seinen Gefässen erscheint vollkommen normal; aber direkt an seinen temporalen Rand setzt sich eine sichelförmige, ca.  $\frac{1}{4}$  PD breite, scharf begrenzte Blutung an. Sehr peripher oben innen und unten aussen zeigt eine grosse Partie des Hintergrundes die charakteristische weissliche Verfärbung der Commotio retinae. Am temporalen Äquator ist eine grosse, glänzend gelblichweisse Fläche zu sehen, die in horizontaler Ausdehnung soweit nach vorne sich erstreckt, dass das vordere Ende kaum mehr sichtbar ist. Eine sehr ausgedehnte Blutung deckt einen grossen Teil derselben. Ihre Ränder sind mit grösstenteils dunkelroten Blutklumpen bedeckt, so dass über die Form der Berandung nichts Sicheres gesagt werden kann. Von ihrem papillaren Ende ist die Netzhaut gegen die Macula zu diffus blutig suffundiert. Über die äusseren Partien des Hintergrundes liegen noch weitere Blutungen der verschiedensten Grösse zerstreut.

In den kommenden Tagen wechselte das ophthalmoskopische Bild sehr rasch. Schon am 30. XII. war die Albedo retinae vollkommen verschwunden. Am 31. XII. war eine Spiegeluntersuchung überhaupt nicht möglich, weil auf der hinteren Linsenkapsel ausgedehnte Auflagerungen vorhanden waren, herrührend von in den Glaskörper durchgebrochenen Blutungen. Aber schon am 3. I. 05 waren die Medien soweit aufgehellte, dass der Hintergrund wieder deutlich zu erkennen war. Zum ersten Male war da zwischen der grossen weissen Fläche und der Gegend der Macula ein vertikal von den oberen zu den unteren temporalen Gefässen streichender gelblichweisser, sehr schmaler, an einer Stelle grauschwarz gesäumter Streifen zu sehen.

Von diesem Zeitpunkte an war auch eine genauere Orientierung über die äquatorialen Veränderungen möglich. Aus diesen Tagen stammt das dargestellte Bild.

Wegen der Notwendigkeit eines grösseren Gesichtsfeldes wurde das umgekehrte Bild gewählt, dasselbe aber aufrecht reproduziert.


Der Sehnerv ist normal, nur sind keine makularen Gefässe zu sehen. Direkt an den äusseren Sehnervenrand setzt sich noch eine blutige Sichel an, die gegen den Tag des Eintritts des Pat. nur etwas schmaler geworden ist. Sie liegt auf einem breiteren, ziemlich scharf konturierten, graugrünen Hofe, der die Grösse der ursprünglichen Blutung angibt und dessen oberer äusserer Rand bereits sich zu pigmentieren beginnt. Der wesentlichste Befund liegt in den horizontalen äusseren äquatorialen Partien. Es fällt sofort eine ca. 4 PD nach aussen vom Sehnerv beginnende, grosse, gelblichweiss glänzende Fläche auf mit annähernd bikonvexen Rändern und mit 4 PD an der breitesten Stelle betragendem Abstände, die im Bilde annähernd zur Hälfte zur Darstellung gebracht ist. Sie bietet keine besondere Zeichnung; nur ist sie zum grössten Teile von mächtigen, meist horizontal streichenden, flammigen oder regellos geformten Blutungen bedeckt. Ihre scharfkantigen, straff gespannten Ränder sind namentlich nach oben in einem breiten Saume graugrün gefärbt. Man bekommt deutlich den Eindruck, dass sie nur unmerklich vorspringen und dass der untere an einer Stelle wie umgeschlagen erscheint. An der Basis des oberen zieht sich ein breiter tiefgrauroter Streifen hin, der allmählich in einen gleichmässig karminroten Hof übergeht. Über den Rand des untern Saums, der ebenfalls von einem roten Hofe begleitet ist, legt sich eine dicke, dunkelrote, zackige Blutung, die in den Glaskörper hereinragt. Eine prägnante ophthalmoskopische Erscheinung stellt ein weisser Streifen dar von der Breite eines grösseren Netzhaut-

gefässes, der an den oberen temporalen Gefässen beginnend leicht bogenförmig geschweift temporalwärts von der Macula lutea nach abwärts bis zu den unteren Schläfengefässen zieht. In der Höhe des Zusammenflusses der beiden Ränder der beschriebenen weissen Fläche verbreitert er sich zu einer Raute, die in ihrer Mitte einen grauen Pigmentfleck trägt und deren äusserer und innerer Rand auf eine kurze Strecke ebenfalls grauschwarz pigmentiert ist. Unterhalb der Raute bildet der Streifen ein Knie, von welchem ein Fortsatz nach unten aussen abzweigt, um sich mit der Knickungsstelle eines ebenfalls nach abwärts ziehenden dritten weissen Streifens zu verbinden, so dass auf diese Weise annähernd die Form eines H entsteht. Einzelne kürzere derartige Streifen spalten sich weiter davon ab. An Stelle der Hförmigen Figur liegt eine horizontal streifige dünne Blutschicht, die zum Teil die weissen Streifen verschleiert. Unterhalb dagegen sitzt eine sehr grosse, zackige, dunkelrote Blutung, die etwas in den Glaskörper hereinragt.

Der vorliegende Fall dürfte die Berechtigung seiner Beschreibung und Abbildung durch die seltene Kombination verschiedener ophthalmoskopischer Veränderungen erweisen. Es sei dabei von der nur ganz wenige Tage bestandenen Albedo retinae vollständig abgesehen. Der auffallendste Befund ist jedenfalls die schon unmittelbar nach der Verletzung konstatierte grosse, weisse Fläche in den äusseren äquatorialen Partien, die jetzt nach 4 Monaten noch genau in derselben Grösse, Form und Farbe besteht. Es kann wohl nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, dass es sich um eine direkte, d. h. an der Stelle des Anpralls der Revolverkugel hervorgerufene Aderhautreptur handelt. Direkte Rupturen, die im Gegensatz zu den indirekten der Natur der Sache nach keine so bestimmte Prädispositionsstelle zeigen können, sind zwar viel seltener, als indirekte, aber die in der Literatur bekannten sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gerade auch durch Schussverletzungen bedingt. Als besonders auffallend muss im gegebenen Falle die ganz bedeutende Grösse des Risses bezeichnet werden. Er hat zweifellos die ganze Dicke der Aderhaut vom Retinalepithel bis zur Sklera durchsetzt. Die weisse Fläche kann als nichts anderes als die freiliegende Lederhaut aufgefasst werden. Äusserst befremdend ist das Verhalten der Netzhaut. Wenn man auch bedenkt, dass die Aderhaut viel leichter einreiss als die Netzhaut, so möchte man es doch fast für selbstverständlich halten, dass bei einer so grossen Aderhaut-Ruptur wie der vorliegenden, auch die Netzhaut mit einreissen oder durch die begleitende grosse Blutung abgelöst werden müsse. Es ist aber weder das eine noch das andere eingetreten. Hat man ja doch in den ersten Tagen nach der Verletzung noch zwei kleine Netzhautgefässe über den Rand der Rupturstelle verfolgen können. Die graugrünen Ränder, die eine Zeit lang den Aderhautriss umsäumten, könnte man ja wohl für die Ränder einer Netzhautreptur halten. Dagegen spricht aber schon die scharfe Conturierung und straffe Spannung der Ränder, die bei Netzhautrepturen gerne eingerollt sind und die enorme Breite des klaffenden Spaltes; dagegen spricht vor allem aber auch der Umstand, dass man bei den verschiedenen Vorstellungen des Patienten nach seiner Entlassung sich von der sehr rasch eintretenden schwarzen Pigmentierung des ursprünglich olivgrünen, breiten Saumes bis hart an die Rupturstelle heran überzeugen konnte, ein Vorgang, der bei den flottierenden Rändern einer Netzhautreptur, die wohl graugrün getrübt bleiben müssten, unverständlich wäre, ganz abgesehen davon, dass eine wesentliche Niveaudifferenz nicht nachweisbar ist. Die graugrünen Ränder gehören offenbar der retrahierten Aderhaut an. Beim Zusammenschieben der Aderhaut und einer dadurch bedingten Fältelung derselben ist offenbar das Retinalepithel grösstenteils zu Grunde gegangen. Von noch erhaltenen Epithelien aus und von den Rändern des intakten Epithels her ist dann später die intensive Pigmentierung der Rupturränder erfolgt.

Durch die Gewalt des anprallenden Projektils ist offenbar eine solche Impression der Skleralkapsel bedingt gewesen, dass eine starke Zerrung der Chorioidea an ihrem temporalen Sehnervenansatz statt hatte. Die sofort nach der Verletzung beobachtete breite sichelförmige, hart an den äusseren Optikusrand sich ansetzende Blutung beweist, dass entweder nur die innersten Schichten der Chorioidea mit Einschluss des Retinalepithels oder die Aderhaut in ihrer ganzen Dicke vom temporalen Sehnervenrande abgerissen wurde. Die nach Resorption der Blutung aufgetretene graugrüne Fläche muss entweder als ein den Raum zwischen Sehnerv und





J. Oeller pinax.

Ruptura chorioideae directa; Fissurae laminae vitreae. Av



**BOLDOUT BLA**



Rand der abgerissenen Aderhaut vollkommen ausfüllendes oder den stehengebliebenen hinteren Schichten der Aderhaut aufgelagertes Exsudat aufgefasst werden, da der Farbenton die Annahme einer freiliegenden Sklera ausschliesst. Vom Rande des Retinalepithels ging dann später eine Pigmentwucherung aus, die die ganze Breite des Defektes in Form eines schwarzen Konus überzog.

Dass unvollständige, nicht die ganze Dicke der Aderhaut durchsetzende Risse vorkommen, dürfte nicht dem geringsten Zweifel unterliegen können. Wenn ich auch Hirsch\*) nicht beistimmen kann, der, wie es scheint, alles, was wir bisher Ruptur der Aderhaut geheissen haben, nur für Sprünge im Retinalepithel und der Glaslamelle ansieht, so sind doch gewisse ophthalmoskopische Befunde zweifellos nichts anderes als solche Einrisse des Epithels und der Glaslamelle. Dazu sind sicher auch die langen, geschweiften Streifen mit der rautenförmigen Erweiterung und die Hförmige Figur unseres Falles zu rechnen. Solche Sprünge können für sich allein bestehen, können aber auch die Fortsetzung direkter oder indirekter, die ganze Dicke der Aderhaut durchsetzender Rupturen sein. Sie sind oft sehr lange, dabei aber nicht breiter als ein grösseres Netzhautgefäss. Dieses Verhalten wäre ganz unbegreiflich, wenn es sich dabei um komplette Rupturen handelte. Bei der Länge solcher Risse und der Spannung, unter welcher die Aderhaut steht, müssten sie doch vielmehr klaffen. Risse und Sprünge in der Glas-

\*) Hirsch C.: Untersuchungen über die Pigmentierung der Netzhaut. Karger, Berlin. 1905. pag. 75.

lamelle und dem E wahrnehmbar wie nach dem Trauma körperblutungen Lamina vitrea me verhüllt sind. Ein anders als mit Läs Wenn nun diese zu einem Detritus anderen Lichtbrech werden können in lange besteht als di dieser Zeit hat sich und gewöhnlich a Rändern des Epit weisser, vielfach v auch noch keine an mir doch dieser E Hirsch\*) gegebene wordene Sklera. Glashaut selbst in durch Reflexion u Sichtbarwerden der

\*) l. c. pg. 83.

On the 27<sup>th</sup> Dec. 1904 W. L., farmservant, aet. 18 years, was being shown a small revolver by a friend, when it went off through some carelessness in handling it, the bullet penetrating his left orbit. He was admitted into the hospital on the following day, when by means of the X-rays a round shadow was made out, situated in the orbit near to the temporal wall.

His condition was further as follows:

Right Eye: Em., V. =  $\frac{6}{6}$ ; external parts and fundus normal.

Left Eye: V. = handmovements at 1 metre eccentrically; the nasal half of the field of vision is almost entirely lost, the defect including the point of fixation and extending for  $10^{\circ}$  on the temporal side; the lids are somewhat swollen and ecchymosed. There is a notch in the lower lid near the outer canthus. A shallow groove runs backwards for some distance in the outer equatorial region of the ocular conjunctiva and the superficial layers of the sclerotic. Cornea, anterior chamber, iris, lens, and vitreous clear. The optic disc and its vessels appear perfectly normal: but lying against its temporal margin is a sharply defined, crescent-shaped haemorrhage about  $\frac{1}{4}$  disc's diameter in breadth. The extreme periphery of the fundus in the upper and inner quadrant as well as in the lower and outer shows over a large area the characteristic whitish discoloration of commotio retinae. In the temporal equatorial region one sees a large shining yellowish-white surface which extends forwards in a horizontal plane almost farther than one can trace it. A great part of it is covered by a very extensive haemorrhage. Its circumference is obscured by blood-clots, the majority of which are dark red in colour, so that it is impossible to say anything definite about the shape of it. The retina shows diffuse ecchymosis between the papilla and the yellow spot. Other haemorrhages, varying greatly in size, are seen scattered over the temporal half of the fundus.

During the next few days the ophthalmoscopic picture changed very rapidly. By the 30<sup>th</sup> Dec. the contusion of the retina had entirely disappeared. On the 31<sup>st</sup> it was quite impossible to make an ophthalmoscopic examination owing to the fact that large clumps of blood, proceeding from haemorrhages that had burst into the vitreous, were deposited on the posterior capsule of the lens.

The optic di discerned. A cres edge of the disc; the day of the p well-defined, greyi of the haemorrhag along its upper an ance is situated at in a horizontal pla white surface whic side of the optic a breadth equal to only one half of not present any s by large flame-shap in a horizontal di drawn tight, and along the upper r of being just raise back at one point the upper border, red areola. A dens lower border whi areola: this haemo feature in this oph as broad as one o superior temporal temporal side of ferior temporal ve borders of the wh a diamond-shaped centre and shows and a part of its makes a bend fro and outwards to also runs downwar formed. Several



cannot show any definite seat of election as those of indirect rupture do, are much more uncommon than the latter, but the great majority of the cases recorded in literature have been the result of gunshot wounds as here. The enormous size of the rupture in this case deserves special notice. It undoubtedly involves the entire thickness of the choroid from the retinal epithelium layer to the sclerotic. The white surface cannot be taken for anything else than the exposed sclerotic. The behaviour of the retina is very strange. Although one remembers that the choroid is much more easily ruptured than the retina, one is almost tempted to take it for granted that with such an extensive rupture of the former layer as we find here the latter must have been torn at the same time or detached by the large amount of haemorrhage that occurred. But neither of these injuries has taken place. For in the first few days after the accident it was still possible to trace two small retinal vessels over the edge of the rupture. The greyish-green borders that for some time lined the sides of the rupture in the choroid might well be taken for the edges of a rupture in the retina. Such an idea is opposed by the sharp outline and straightness of the sides (in rupture of the retina they tend to curl round), and by the enormous breadth of the rupture: it is above all opposed by the fact that at the various visits which the patient made after his discharge from the hospital one could watch with certainty the black pigmentation which set in very rapidly along the broad originally olive-green border close up to the edge of the rupture, a process which would be unintelligible in the floating edges of a rupture in the retina (which would be bound to remain in the same greyish-green opaque condition), not to speak of the fact that no material difference in level could be made out in these parts. The greyish-green borders evidently belong to the retracted choroid. Since this layer was retracted and consequently became wrinkled, the greater part of the retinal epithelium has evidently disappeared. The epithelial cells still remaining have then proliferated and spread from the edge of that layer and subsequently brought about the intense pigmentation of the edges of the rupture.

The bullet has evidently made such a dint in the sclerotic from the force of the blow that it caused considerable tearing of the choroid from its attachment at the temporal margin of the optic disc. The broad crescent-shaped haemorrhage that was observed immediately after the accident close to the outer edge of the papilla proves that either only the innermost layers of the choroid together with the retinal epithelium were torn away at this point or that all the layers of the coat suffered. The greyish-green surface that became visible after the absorption of the haemorrhages must be regarded as an exudation which either completely fills up the space between the disc and the edge of

the detached choroid, or is deposited on the posterior layers of the choroid still remaining, because the colour of it precludes the possibility of its being the exposed sclerotic. Proliferation subsequently began at the edge of the pigment epithelium layer, which spread over the whole of the space to form a black crescent.

There is absolutely no doubt that incomplete rupture of the choroid, i. e. involving only some of the layers of the coat, does occur. Although I cannot agree with Hirsch\*), who apparently regards all that we have hitherto designated 'rupture of the choroid' as mere fissures in the pigment epithelium and lamina vitrea, there are nevertheless undoubtedly certain ophthalmoscopic conditions which are nothing else than fissures in these last-named layers. The long curved streak with the diamond-shaped enlargement and the H-shaped figure in our case are certainly instances of this. These fissures may occur alone, or they may be a continuation of direct or indirect ruptures involving the whole thickness of the choroid. They are often very long but in breadth do not exceed the size of the larger retinal vessels. Such appearances would be inconceivable in ruptures that were complete. Considering the length of these fissures and the tension in which the choroid is kept, they would be bound to gape more. Rents and fissures in the vitreous lamina and retinal epithelium layer can usually be observed with the ophthalmoscope much earlier than complete ruptures. While the latter are hidden under large haemorrhages in the choroid, retina, or vitreous immediately after the accident, the former are usually not at all, or only partially, obscured by haemorrhages. It is difficult to imagine rents in the pigment epithelium unaccompanied by some lesion of the percipient elements. If now these elements become degenerated and break down along the course of such a long fissure, a difference in the refractive power of the debris might very possibly render it visible with the ophthalmoscope as a yellowish-white streak, which persists as long as the absorption of the products of degeneration goes on. During this time, however, a process of cicatrisation in the vitreous lamina and usually also in the proliferation of pigment from the edge of the epithelium layer has set in, so that in the future a white streak covered with many spots of pigment remains. Although no records of a microscopical examination have yet been made, this explanation seems to me more probable than that given by Hirsch\*\*), who says: "The white streak is not the sclerotic that has become visible. It is rather the vitreous lamina itself that appears in it and at the same time by the reflection and irregular refraction of the light prevents the choroid from becoming visible".

\*) Hirsch, C.: *Researches on the pigmentation of the retina*. 1905, p. 75.

\*\*) l. c. page 83.



ayers of  
udes the  
a subse-  
c, which  
cent.  
e of the  
at, does  
parently  
choroid'  
a, there  
nditions  
layers.  
nent and  
of this,  
ation of  
s of the  
exceed  
would  
ring the  
oroid is  
sures in  
ally be  
complete  
rrhages  
ccident,  
ured by  
pigment  
ements.  
n along  
fractive  
le with  
persists  
goes on.  
vitreous  
om the  
uture a  
s. Al-  
et been  
at given  
clerotic  
a itself  
regular  
isible".







